DESCRIPTIONS D'ARACHNIDES NOUVEAUX DE LA FAMILLE DES SALTICIDÆ (ATTIDÆ)

(SUITE) (1)

par E. Simon.

Padillothorax taprobanicus sp. nov. — ♂. Long. 6 mill. — Cephalothorax fusco-rufescens, utrinque prope oculos niger, valde coriaceus, pilis simplicibus pronis et longis, pallide luteis, in parte cephalica sat densis in thoracica vittas radiantes confusas designantibus, vestitus. Pili oculorum parvi, supra oculos flavidi, subtus albidi. Clypeus glaber. Abdomen angustum, longum et cylindraceum, postice acuminatum, supra albido-testaceum, vitta media fusco-olivacea, antice lata et parallela, postice angustiore et dentata, utrinque, prope medium, ramulum antice arcuatum emittente, notatum, subtus fulvo-testaceum. Chelæ fusco-rufulæ, coriaceæ et glabræ, sat breves sed latæ, ad marginem exteriorem dilatato-rotundæ, carinatæ atque prope apicem minute dentatæ. Partes oris fusco-rufulæ. Sternum luteum, læve, parce albo-pilosum. Pedes 1^{i} paris longi et robusti, fusco-castanei, tarso dilutiore, tibia subtus sat crebre sed non longe nigro-hirsuta, ut in *P. semiostrino* E. S. aculeati. Reliqui pedes omnino flavidi. Pedes-maxillares fulvi, graciles; femore longo, leviter curvato; patella longa; tibia patella circiter 1/3 breviore, angustiore et tereti, apophysi parva simplici et nigra extus ad apicem armata; tarso angusto sat longo; bulbo simplici.

♀. Long. 6 mill. — A mari differt clypeo angustiore, chelis extus muticis, pedibus 1^{i} paris flavidis, haud ciliatis, robustis sed brevioribus. Area genitalis semicircularis, fusco-rufula et coriacea, in medio lævior, nigra et foveolis binis subrotundis et geminatis impressa. — Ins. Taprobane (Mus. O. P. Cambridge).

A *P. semiostrino* E. Sim. differt cephalothorace paulo breviore et altiore, area oculorum paulo longiore, parte thoracica haud duplo breviore, chelis maris extus minute dentatis, tibiis anticis brevius ciliatis, etc.

Bavia Thorelli sp. nov. — ♂. Long. 8 mill. — Cephalothorax subtiliter coriaceus, rufo-piceus, parte cephalica, prope oculos, thoracica in declivitate nigricantibus, parte cephalica et thoracica in medio pilis pallide luteis (in thoracica lineas radiantes designantibus) vestitis, margine frontali pilis coccineis longioribus, supra oculos cristam formantibus, ornato. Pili oculorum læte rufi sub

(1) Voir Ann. Soc. ent. Belg., t. XLIV (1900), p. 381, et t. XLV (1901), p. 141.

oculis albi. Clypeus angustus, fere nudus. Abdomen angustum et longum, postice acuminatum, supra olivaceum parce luteo-pilosum, in parte basali utrinque linea, postice leviter ampliata atque incurva, in parte altera maculis binis, apicali minore, albidis ornatum, subtus glabrum et nigricans. Sternum fulvum utrinque infuscatum. Partes oris chelæque castaneæ, chelæ longæ, leviter divaricatæ, antice planæ, intus ad basin, extus, prope apicem, tenuiter carinatæ, marginibus sulci longis, pilis longis curvatis uniseriatis munitis, superiore dentibus quatuor inter se distantibus, inferiore dentibus remotis trinis æquis et contiguis munitis. Pedes 1^{i} paris crassi, nigricantes, patella apiceque tibiæ dilutioribus, tarso flavido, tibia metatarsoque subtus longe et crebre nigro-crinitis. Reliqui pedes flavidi, metatarso 2^{i} paris infuscato, tibiis metatarsisque posticis basi anguste nigris. Tibia 3^{i} paris aculeis interioribus binis munita sed tibia 4^{i} paris mutica. Pedes-maxillares parvi et graciles, lutei; tibia patella breviore et præsertim angustiore, apophysi subapicali nigra, parva, gracili et leviter curvata armata; tarso sat angusto, bulbum sat longe superante; bulbo convexo. — Celebes : Minahassa.

Cosmophasis australis sp. nov. — ♀. Long. 4,5 mill. — Cephalothorax fusco-rufescens, parte cephalica utrinque late nigra, thoracica valde declivi postice sensim dilutiore, subtiliter coriaceus, pilis crassis pronis sordide albidis vestitus, quadrangulo oculorum, superne viso, parallelo et postice cephalothorace haud angustiore, stria thoracica minutissima vix perspicua, evidenter pone oculos sita. Oculi antici maximi, inter se contigui, apicibus in lineam rectam, pilis longis albidis marginati. Clypeus oculis mediis anticis plus triplo angustior, parce et longe albido-barbatus. Abdomen oblongum, depressiusculum, supra fulvo-testaceum, in parte basali vitta longitudinali et utrinque vitta latiore obliqua, in parte altera arcubus transversis, 1° latiore, pallide fuscis ornatum, pilis squamiformibus, longe ovatis, albidis et paululum nitidis vestitum, subtus pallide luteum, albo-pubescens. Chelæ breves, fulvo-rufulæ, læves et nitidæ, margine superiore sulci ad angulum dentibus minutissimis binis, inferiore obliquo, dente majore et acuto armatis, ungue longo. Partes oris sternumque fulvo rufula, lævia, pars labialis infuscata. Sternum antice sat attenuatum sed truncatum. Pedes lutei, femoribus anticis intus ad apicem minute fusco-notatis. Pedes 1^{i} paris reliquis evidenter crassiores, tibiis aculeis sat longis 3-3, metatarsis, tibiis brevioribus, aculeis similibus 2-2 subtus instructis, tibiis 4^{i} paris intus aculeis minutissimis binis altero submedio altero apicali, metatarsis quatuor posticis tibiis haud brevioribus, aculeis parvis apicalibus verticillatis aculeoque inferiore, ante medium

sito, armatis. Plaga genitalis fusca et coriacea, transversa et semilunaris.

♂. Long. 5 mill. — Cephalothorax fusco-castaneus, parte cephalica fere nigra, tenuiter coriaceo-rugosus, sordide luteo-squamulatus. Pili oculorum supra oculos fulvo-rufuli, infra oculos albi. Clypeus oculis mediis plus duplo angustior, sub oculis glaber, ad marginem pilis albis crassis uniseriatis ornatus. Abdomen (fere depile) angustum et longum, nigrum, supra in medio parce squamulatum sed utrinque vitta lata et postice macula splendide argenteo glaucoque squamulatis, marginatum, subtus simpliciter albopilosum, sed postice, prope mamillas, micanti-squamulatum. Mamillæ nigræ. Chelæ longiores, parallelæ, fusco-rufulæ, antice deplanatæ, glabræ et valde coriaceæ, marginibus sulci longioribus, inferiore dente validiore et remotiore armato. Pedes 1[i] paris reliquis robustiores, femore compresso et subclavato, obscure lutei sed utrinque infuscati et subvittati, ut in femina aculeati, sed aculeis tibiarum brevioribus. Reliqui pedes omnino lutei, metatarsis quatuor posticis apice aculeis verticillatis, metatarso 3[i] paris aculeo parvo subbasilari, metatarso 4[i] paris aculeis similibus binis munitis. Pedes-maxillares parum robusti, fusci, parce albido-pilosi; tibia patella paulo breviore supra ad apicem leviter convexa, extus apophysi cariniformi, longe et oblique truncata, nigro-marginata, cum angulo inferiore acute producto, armata; tarso longe ovato. — Africa australis (ex Museo G. et E. Peckham).

Heliophanus Peckhami sp. nov. — ♂. Long. 4 mill. — Cephalothorax subtiliter coriaceus, niger, linea exillima albo-pilosa cinctus. Pili oculorum luteo-cinerei. Clypeus retro-obliquus, fere nudus. Abdomen supra nigrum, obscure fulvo-pubescens, in parte basali linea marginali, prope medium linea transversa exili, in medio late interrupta et postice utrinque puncto parvo niveo-pilosis, decoratum, subtus antice albo postice fulvo-pubescens. Chelæ, partes oris sternumque nigra. Pedes nigricantes, albo-pilosi et sublineati, metatarsis tarsisque cunctis et coxis posticis dilutioribus et obscure fulvis, tibiis metatarsisque anticis pilis tenuibus longis et curvatis paucis subtus munitis, aculeis ut in *H. deserticola* ordinatis. Pedes-maxillares nigri, femore patellaque ad apicem niveo-pilosis, tarso vitta niveo-pilosa supra ornato; femore subtus mutico et subrecto, ad basin haud anguloso sed intus, prope medium, minute et obtuse mucronato; patella mutica; tibia patella paulo breviore et crassiore haud inflata, extus ad marginem inferiorem, apophysi subbasilari valida et conica infra directa et subtus ad apicem apophysi fere simili sed antice directa, armata; tarso longo; bulbo haud mucronato. — Africa australis (ex Mus. G. et E. Peckham).

Ab *H. deserticola* cui valde affinis est imprimis differt pilis oculo-

rum cinereis haud albis, femore pedum-maxillarum ad basin haud anguloso sed intus prope medium minute mucronato, tibia haud inflata sed apophysibus binis majoribus instructa.

Pseudicius histrionicus sp. nov. — ♀. Long. 4 mill. — Cephalothorax angustus et longus, niger, antice subtiliter coriaceus, postice lævis, pilis simplicibus longis albis, ad marginem frontalem in medio atque utrinque in declivitate, parum dense vestitus, stria thoracica punctiformi remota, a margine postico quam ab oculis vix remotiore. Oculi ser. 2ᵃᵉ non longe ante medium, inter oculos laterales anticos et posticos, siti. Oculi quatuor antici inter se valde inæquales et contigui, apicibus in lineam rectam, pilis albis cincti. Clypeus angustus, parce et longe albo-barbatus. Abdomen longum, teretiusculum, supra nigrum, antice vitta marginali lata semicirculari, dein vittis transversis quatuor, 1ᵃ et 2ᵃ valde arcuato-angulosis, alteris subrectis, testaceis et albo-pilosis, ornatum, subtus obscure testaceum. Chelæ glabræ, fulvo-rufulæ, nitidæ, transversim parce striatæ. Sternum nigrum. Pedes nigricantes, coxis tarsisque fulvo-olivaceis, tibiis anticis muticis, metatarsis brevibus tarsis haud longioribus, aculeis 2-2 brevibus et robustis armatis. Pedes postici, anticis multo longiores, omnino mutici. Area genitalis magna, leviter depressa, pilis albis marginata, plagula media nigro-nitida valde foveolata et fere semicirculari notata. — Africa australis (ex Mus. G. et E. Peckham).

P. zebra sp. nov. — ♀. Long. 3 mill. — Cephalothorax ovatus, supra planus, antice subtiliter coriaceus, ater, supra fulvo-pubescens et vitta media albo-pilosa, in medio ampliata et rhomboidali, notatus, utrinque in declivitate subglaber sed vitta marginali latissima albo-pilosa cinctus. Pili oculorum et clypei crassi et longi albidi. Stria thoracica parva remota. Oculi ser. 2ᵃᵉ paulo ante medium, inter oculos laterales anticos et posticos, siti. Oculi quatuor antici inter se valde inæquales et contigui, apicibus in lineam rectam. Abdomen longe oblongum, supra longe et crebre albo-sericeo-pubescens, utrinque vittis obliquis latis, antice convergentibus et postice supra mamillas vittis minoribus binis, intense nigris, decoratum, subtus luteum et albo-pubescens. Chelæ nigro-nitidæ. Sternum nigrum, longe et parce albo-pilosum. Pedes lutei, albo-pilosi, patellis tibiisque anticis utrinque leviter infuscatis, tibia 1ⁱ paris subtus ad marginem exteriorem aculeo parvo subbasilari, ad marginem exteriorem aculeo simili subapicali, metatarso, tarso paulo longiore, aculeis mediocribus 2-2, subtus armatis. Pedes postici, aculeis apicalibus metatarsorum exceptis, mutici.

♂. Long. 3 mill. — Cephalothorax niger supra fulvo-pubescens, linea media sat angusta et utrinque linea marginali albo-pilosis

ornatus. Pili oculorum obscure rubri. Clypeus crasse et dense niveo-barbatus. Abdomen supra nigerrimum, vitta media integra sat angusta et utrinque vitta marginali niveis decoratum, subtus albido-pubescens. Pedes 1[i] paris robusti, castanei, utrinque nigri, tibia aculeo interiore subapicali tantum armata, metatarso aculeis validis suberectis 2-2 instructo. Reliqui pedes fusco-olivacei, coxis tarsisque dilutioribus. Pedes-maxillares breves et robusti, fusco-rufuli, femore patella tibiaque crasse albo-pilosis; femore valido et curvato; tibia patella multo breviore, latiore quam longiore, extus ad apicem apophysi valde compressa acuta et antice directa armata; tarso sat longo, teretiusculo, extus ad basin depresso subfoveolato; bulbo apice obtuso et depresso, ad basin convexo turbinato et obliquo. — Africa max. austr. : Prom. Bonæ Spei! P[t] Elizabeth. (Dr C. Martin.)

Admestina bitæniata sp. nov. — ♂. Long. 3 mill. — Cephalothorax longus, fusco-castaneus, parte cephalica dilutiore, aurantiaco-tincta, sed utrinque prope oculos nigra et maculis medianis fuscis binis confusis notata, subtiliter coriaceus et fere glaber, sed utrinque linea albo-pilosa ornatus. Pili oculorum et clypei luteo-albidi, clypeus sub oculis nudus, ad marginem longe et crebre barbatus. Abdomen anguste oblongum, supra fusco-castaneum, late albido-marginatum, subtus atrum. Chelæ fuscæ. Sternum nigro-nitidum. Pedes 1[i] paris crassissimi, fusco-olivacei, utrinque nigri, metatarsis tarsisque luteis et fusco-lineatis. Reliqui pedes pallide lutei subpellucentes, femoribus, præsertim posticis, utrinque fusco-variatis, patellis tibiisque tenuiter nigro-cingulatis et sublineatis. Pedes-maxillares breves et robusti, fusci; tibia patella breviore, supra ad apicem leviter prominula et obtusa, extus apophysi longissima, antice directa, arcuata, gracili et depressa, instructa; tarso late ovato; bulbo magno valde convexo.

♀. Long. 3,5 mill. — A mari differt cephalothorace dilutiore, parte cephalica aurantiaco-tincta, confuse fusco-bimaculata. Pili oculorum et clypei densi albi. Abdomen majus, ovatum, albidum et lineis binis parallelis nigricantibus supra ornatum, subtus utrinque nigricanti-marginatum. Pedes lutei, pedes 1[i] paris crassi, femore ad apicem patella tibiaque valde infuscatis, patellis tibiis metatarsisque 3[i] et 4[i] parium tenuissime nigro-cinctis et femoribus 4[i] paris annulo latiore subapicali ornatis. Plaga genitalis magna, antice nigra, leviter depressa, coriacea et cordiformis, postice testacea et acute emarginata. — Chili : Sierra de Chillan (Germain).

Sassacus arcuatus sp. nov. — ♂. Long. 3 mill. — Cephalothorax subtiliter coriaceus, niger, utrinque vitta lata arcuata lineaque marginali angustiore flavido-squamulatis ornatus. Pili

oculorum pauci cinerei. Clypeus angustus, crasse flavo-barbatus. Abdomen breviter ovatum, nigrum, in parte basali vitta marginali lata arcuata punctisque mediis parvis binis, in parte altera linea transversim recurva flavido-squamulatis supra ornatum. Sternum nigrum, longe albo-pilosum. Chelæ glabræ et nitidæ sed transversim subtiliter striatæ, longissimæ, valde attenuatæ et divaricatæ, subtransversæ, margine inferiore sulci carinato, dente subapicali valido, longo et acuto, superiore dente parvo subapicali denteque basali longiore, armatis, ungue rufulo, longissimo et acuto. Pedes nigri, patellis, tibiis, matatarsisque ad basin dilutioribus, fulvis et albo-squamulatis, tarsis luteis. Pedes-maxillares sat longi et graciles, nigri, femore supra ad apicem minute flavo-notato; tibia patella multo breviore, extus ad apicem emarginata et apophysi valida et brevi armata; tarso anguste ovato; bulbo intus valde convexo subgloboso. — Regio Amazonica : Teffe (de Mathan).

S. trochilus sp. nov. — ♂. Long. 3 mill. — Cephalothorax subtiliter coriaceus, niger, squamulis fulvo-æneis, squamulis parvis viridi-micantibus mixtis, vestitus, parte cephalica utrinque albo-pilosa, parte thoracica, pone oculos, lineis binis angustis albo-squamulatis ornata. Pili oculorum albidi. Pili clypei longi albido-lutei. Quadrangulus oculorum fere parallelus et postice cephalothorace vix angustior. Oculi parvi ser. 2ae vix ante medium siti. Abdomen supra viridi-micanti-squamulatum, antice linea marginali arcuata, dein lineis exilibus transversis binis albis ornatum, subtus atrum. Sternum atrum. Chelæ nigro-castaneæ, læves, longæ et divaricatæ, antice deplanatæ, apice attenuatæ sed intus ad angulum prominulæ Pedes quatuor antici fusco-rufuli, patellis tibiisque annulis albo-squamulatis ornatis. Pedes quatuor postici lutei. Pedes-maxillares fusco-rufuli; tibia patella multo breviore, extus ad apicem apophysi valida conica antice directa armata; tarso sat anguste ovato; bulbo intus valde convexo subgloboso. — Brasilia : le Para.

S. biaccentuatus sp. nov. — ♀. Long. 3 mill. — Cephalothorax subtiliter coriaceus, parte cephalica nigra, thoracica fusco-castanea, pilis squamiformibus pallide luteis vestitus. Pili oculorum et clypei densi omnino flavi. Abdomen ovatum, albidum, luteo-pubescens, supra arcubus binis maximis, in medio latis et testaceo-bimaculatis, utrinque oblique et longe attenuatis, vitta longitudinali abbreviata et postice maculis obliquis binis fusco-lividis, supra ornatum, subtus vitta media lata et parallela nigra notatum. Chelæ sternumque nigro-nitida. Pedes omnino flavi, tibiis 1i paris aculeis exterioribus trinis, interioribus binis subtus armatis. — Paraguay (Germain).

S. aurantiacus sp. nov. — ♀. Long. 3 mill. — Cephalothorax subtiliter coriaceo-rugosus, niger, omnino aurantiaco-nitido-

pubescens. Pili oculorum et clypei flavidi. Abdomen supra aurantiaco-nitido-pubescens subsquamulatum et postice utrinque, maculis binis obliquis nigris notatum, subtus parce albo-pilosum. Chelæ, partes oris sternumque fusco-olivacea. Pedes fulvo-rufuli, femoribus, præsertim anticis, valde infuscatis, tibia metatarsoque 4^{i} paris apice fusco-annulatis. Tibia 1^{i} paris aculeis exterioribus trinis, interioribus binis, subtus instructis. Plaga genitalis fusco-rufula, semicircularis, foveolata et carinula secta. — Brasilia : Theresopolis, pr. Rio.

S. resplendens sp. nov. — ♂. Long. 2 mill. — Cephalothorax subtiliter coriaceus, niger, squamulis subrotundis splendide viridi roseoque micantibus crebre vestitus, utrinque in declivitate et pone oculos luteo-albido-pilosus et linea alba cinctus. Pili oculorum et clypei pauci cinereo-albidi. Abdomen oblongum, postice acuminatum, supra splendide micanti-squamulatum, subtus parce albo-pilosum. Chelæ antice planæ et leviter divaricatæ. Partes oris, sternum, coxæ femoraque nigra, pedum reliqui articuli flavidi, patella tibiaque 1^{i} paris leviter infuscatis sed linea exili albo-squamulata supra ornatis. Tibia 1^{i} paris aculeis exterioribus trinis interioribus binis, tibia 2^{i} paris aculeis binis uniseriatis subtus armatis. Pedes-maxillares nigri; tibia patella multo breviore, extus ad apicem apophysi sat brevi sed valida et antice directa munita; tarso ovato; bulbo intus convexo. — Venezuela : Caracas ! Valencia !

S. marginellus sp. nov. — ♀. Long. 3 mill. — Cephalothorax niger, subtiliter coriaceo-rugosus, squamulis micantibus rubris viridibusque parce vestitus. Pili oculorum pauci cinereo-fulvi. Clypeus fere nudus. Abdomen ovatum, supra nigrum, utrinque in declivitate posticeque testaceum, splendide viridi-aureo-squamulatum, linea albo-pilosa omnino cinctum et postice, supra mamillas, utrinque linea abbreviata et obliqua nivea decoratum, subtus testaceum, vitta media obscuriore notatum. Chelæ nigræ coriaceæ. Sternum nigrum. Pedes flavi coxis castaneis ; tibia 1^{i} paris subtus ad apicem aculeis parvis interioribus binis aculeoque exteriore, tibia 2^{i} paris aculeis apicalibus minutissimis binis, subtus munitis. — Le Para (de Mathan).

Avitus longidens sp. nov. — ♂. Long. 4 mill. — Cephalothorax niger, squamulis fulvo-æneis nitidis crebre vestitus, linea marginali exili vittisque dorsalibus binis latioribus, postice convergentibus, albo-pilosis, ornatus. Pili oculorum rufi, clypei crassi et longi nivei. Abdomen oblongum, supra crebre fulvo-æneo-squamulatum et linea albo-pilosa omnino cinctum, subtus testaceum et

subglabrum. Chelæ antice recte directæ, longissimæ (cephalothorace toto vix breviores) usque ad basin angustæ, fulvæ, breviter et parce pilosæ sed ad apicem penicillatæ. Sternum nigricans. Pedes 1[i] paris fusco-castanei ad basin atque ad apicem dilutiores et lutei. Reliqui pedes lutei, plus minus fusco-variati. Pedes-maxillares mediocres, fulvi; tibia patella breviore, extus apophysi apicali parva nigra et simplici armata; bulbo ovato. — Resp. Argentina.

Ashtabula glauca sp. nov. — ♂. Long. 5 mill. — Cephalothorax niger, subtiliter coriaceus et opacus, supra crebre pallide-viridi-squamulatus, utrinque in declivitate fere glaber. Pili oculorum albidi. Clypeus angustus fere glaber. Abdomen oblongum, crebre pallide glauco-squamulatum et linea exili albidiore cinctum, subtus atrum, parce et simpliciter albido-pilosum. Chelæ robustæ, verticales nigræ, valde et inordinate striatæ. Partes oris nigræ, laminæ extus ad apicem minute mucronatæ. Sternum nigrum, albo-pilosum. Pedes 1[i] paris crassissimi, nigri, leviter coriacei, tibia subtus longissime nigro-fimbriata, metatarso torsoque fulvo-castaneis supra linea albo-squamulata ornatis. Reliqui pedes fulvo-castanei, femoribus nigricantibus, patellis tibiisque utrinque leviter infuscatis et supra linea albo-nitido-squamulata ornatis. Pedes-maxillares nigricantes; femore sat longo, valde curvato fere semicirculari; tibia patella breviore, extus ad apicem apophysi parva et acutissima munita; tarso sat longe ovato, extus ad basin leviter impresso; bulbo maximo, postice producto et obtusissimo.

♀. Long 5-6 mill. — Mari subsimilis sed pedibus sex posticis fulvis leviter fusco-vittatis et supra linea albo-nitido-squamulata ornatis. Pedes-maxillares fulvo-castanei, femore nigricanti, reliquis articulis crebre albo-argenteo-squamulatis.

Var. ♀. Cephalothorax abdomenque supra crebre flavo-aureo-squamulata. — Mexicum : Quernavaca; Guanajuato.

A. dentichelis sp. nov. — ♂. Long. 4 mill. — Cephalothorax obscure fulvo-rufescens, parte cephalica maculis ocularibus latis nigris maculisque mediis binis subgeminatis et subrotundis nigricantibus notata, coriaceo-rugosus, crebre fulvo-micanti-squamulatus, margine frontali albo-pilosa et vittis binis albo-pilosis, antice, sub oculis rectis, postice convergentibus, ornatus. Pili oculorum pauci fulvi. Clypeus angustus, glaber. Abdomen angustum et longum, postice attenuatum, supra fulvo-testaceum vel rufescens, maculis fuscis transversis biseriatis 5-5, interdum confluentibus et vittas duas designantibus, ornatum, crebre fulvo-micanti-squamulatum et utrinque linea exili alba cinctum, subtus vitta lata nigra notatum. Chelæ fusco-nitidæ, sat breves sed leviter porrectæ, apophysi submedia valida et incurva armatæ, ungue longo ad basin

crasso et convexo. Pedes 1[i] paris reliquis multo crassiores et longiores, fusco-castanei, tarso luteo, tibia compressa longe ovata, subtus, inter spinas, longe et crebre nigro-fimbriata, metatarso gracili, tibia vix breviore, aculeis robustis suberectis armata. Reliqui pedes pallide-flavidi, subpellucentes, quatuor postici femoribus prope apicem, patellis tibiisque ad apicem tenuiter nigro-cinctis, patellis tibiis metatarsisque extus nigro-lineatis. Pedes-maxillares fusco-rufuli, breves et robusti; patella tibiaque brevibus, tibia apophysi tenui acuta et valde uncata, extus ad apicem armata; tarso bulboque simplicibus late ovatis. — Venezuela : Caracas! San Esteban!.

A. sexguttata sp. nov. — ♂. Long. 3,6 mill. — Cephalothorax niger, subtiliter coriaceus, squamulis splendide viridibus vestitus, parte cephalica utrinque sub oculis linea albo-pilosa marginata. Pili oculorum pauci obscure fulvi. Clypeus angustus, fere nudus. Abdomen longe oblongum, supra nigrum, vitta marginali vittaque media splendide viridi-squamulatis et punctis parvis niveis sex biseriatis ornatum, subtus atrum, simpliciter et parce albo-pilosum. Chelæ nigro-piceæ, nitidæ, sat longæ, divaricatæ et valde attenuatæ, antice intus dente parvo submedio munitæ, marginibus sulci longis carinatis et depressis, dentibus remotissimis, subbasilaribus, superiore parvo, inferiore longissimo, gracili et arcuato, instructis, ungue longo, subtus, prope medium, dentato. Partes oris sternumque nigra, laminæ extus ad apicem dentatis. Pedes 1[i] paris robusti, nigricantes, metatarso ad basin rufulo et supra albopiloso, tarso luteo, femore late clavato, tibia leviter ovata, tibia metatarsoque subtus longe sed inordinate nigro-crinitis haud fimbriatis. Reliqui pedes fulvi, femoribus valde infuscatis, patellis tibiisque ad apicem leviter umbrosis. Pedes-maxillares fusci; tibia patella breviore, apophysi parva et obtusa, antice directa, extus ad apicem armata; tarso ovato et obtuso; bulbo ad basin valde convexo et subrotundo, ad apicem spinis parvis binis subæquis munito. — Brasilia : Farinda Novo-Niagara, prov. S. Paulo (E. Gounelle, 1898).

Thammaca nigritarsis sp. nov. — ♀. Long. 3 mill. — Cephalothorax longus, parte cephalica antice valde attenuata et declivi, niger, coriaceus, pilis crassis luteis crebre vestitus. Pili oculorum et clypei albidi. Oculi medii antici maximi smaragdinei. Abdomen longe oblongum, atrum, superne pilis squamiformibus luteis vestitum. Chelæ nigræ, transversim striatæ, parce et longe albo luteoque crinitæ. Sternum nigrum. Pedes breves, fusco-castanei, metatarsis cunctis luteis. Tibiis 4[i] paris annulo basali luteo ornatis. — Amazonas alt. : S. Paulo de Olivença, Fonteboa, Cavalo-Cocho (de Mathan).

T. coriacea sp. nov. — ♂. Long. 3 mill. — Cephalothorax fere parallelus, superne planus, niger, crebre coriaceo-rugosus et squamulis albidis vestitus. Pili oculorum et clypei longi albi. Oculi medii antici magni smaragdinei. Abdomen breviter ovatum, nigrum, supra albido-squamulatum. Chelæ rufulæ, longissimæ, angustæ et divaricatæ, marginibus sulci carinulatis, inferiore, ante medium, dente valido et acuto armato, ungue longissimo, teretiusculo sed prope apicem compresso et arcuato. Pedes fusco-castanei, lineis albo-squamulatis ornati, antici reliquis multo robustiores, metatarsis tarsisque paulo dilutioribus. Reliqui pedes, coxis metatarsis tarsisque flavidis sed metatarsis nigro-lineatis et apice minute nigro-annulatis. Pedes maxillares fusco-castanei; tibia patella multo breviore, apophysi simplici et acuta extus armata; tarso sat longe ovato; bulbo magno, ad basin obtuso et convexo, stylo libero curvato, apicem tarsi fere attingente, intus munito. — Amazonas alt. : S. Paulo de Olivença (de Mathan).

Bianor biocellosus sp. nov. — ♂. Long. 4 mill. — Cephalothorax niger, crebre sed subtiliter coriaceus, fulvo-luteo-pubescens, parte thoracica vitta media abbreviata et utrinque puncto postoculari albis parum expressis notata. Pili oculorum supra fulvi in medio et subtus albi. Clypeus oculis anticis vix 1/3 angustior utrinque albo-pilosus in medio nudus. Abdomen fulvo-luteo-pubescens, in parte apicali utrinque macula rotunda albo pilosa ornatum, subtus cum sterno nigrum et parce albo-pilosum. Pedes fusci fere nigri, tarsis fulvis, patellis tibiisque posticis confuse fulvo-annulatis, longe fulvo alboque pilosi. Pedes-maxillares parvi, nigri, patella tibiaque fulvo, tarso albido-setosis; tibia patella multo breviore, apophysi apicali parva et aciculata extus armata; tarso anguste ovato; bulbo simplici.

♀. Long. 4,6 mill. — A mari differt imprimis clypeo omnino crebre et longe albido-piloso. Pedes maxillares fulvi, albo-pilosi. — Le Para (de Mathan).

Rhene flavicomans sp. nov. — ♂. Long. 4 mill. — Cephalothorax crebre et uniformiter coriaceus, obscure fusco-castaneus, parte cephalica antice et in medio late nigricanti, supra fere glaber, utrinque inter oculos linea exili obliqua atque in declivitate vitta latiore, pone oculum posticum incurva et ampliata, flavo-pilosis, lineaque frontali paulo longius et albidius pilosa ornatus, regione faciei inter oculos obscure fulvo-pilosa sub oculis fere glabra. Abdomen ovatum, supra nigrum vel fusco-piceum, duriusculum et nitidum, in parte basali utrinque vitta longitudinali lata postice sensim ampliata et truncata cum angulo interiore paululum producto, in parte apicali arcu transverso sat lato, læte flavo-pilosis decoratum,

subtus atrum et fere glabrum. Chelæ fusco-castaneæ, valde rugosæ, incurvæ, intus emarginatæ, sed apice obtuse prominulæ. Sternum parvum, nigro-nitidum, parce albo-pilosum. Partes oris nigræ. Pedes 1[i] paris crassissimi, tibia supra leviter deplanata et intus angulosa, obscure fusco-castanei, femore et supra et subtus nigricanti, patella tibiaque et intus et subtus crebre et sat longe cinereo-pilosis. Reliqui pedes obscure fulvi, femoribus ad apicem tibiis utrinque infuscatis, tibiis patellisque lineis binis albo-pilosis supra ornatis. Pedes-maxillares fusco-castanei, parvi; tibia patella breviore, extus ad apicem apophysi nigra parva simplici et acuta armata. — Ins. Taprobane!

Partona euchirus sp. nov. — ♀. Long. 2,5 mill. — Cephalothorax niger, crebre coriaceus, pilis pronis crassis, fulvis, postice sensim albidioribus, supra vestitus, postice in declivitate fere glaber. Pili oculorum pauci albidi, extus flavidi. Clypeus angustus subglaber. Abdomen oblongum, obscure fulvum, supra confuse infuscatum et subvittatum, crebre fulvo-cinereo-pubescens et postice squamulis micantibus paucis utrinque ornatum. Pedes 1[i] paris nigri, patellis ad basin, tibiis supra ad apicem metatarsis tarsisque dilutioribus et fulvis, tibia latissime compressa apice truncata, subtus crasse ciliato-cristata. Pedes quatuor postici lutei, femoribus patellis tibiis metatarsisque utrinque nigro-lineatis. — Brasilia : Rio (Germain).

Homalattus coriaceus sp. nov. — ♀. Long. 2,5 mill. — Cephalothorax niger, valde coriaceo-vermiculatus, glaber, facie clypeoque fere glabris. Abdomen magnum, subrotundum, supra nigrum, duriusculum et nitidum, minute et parce impresso-punctatum et sigillis mediocribus biseriatis 3-3 munitum, subtus atrum, fulvo-pubescens. Chelæ breves et valde coriaceæ. Partes oris, sternum, coxæ, trochanteres femoraque cuncta nigra. Reliqui articuli pedum 1[i] paris rufo-castanei, præterea fulvi plus minus fusco-variati. Plaga genitalis fusco-rufula, lævis, ad marginem posticum fovea transversa sulciformi impressa. — Africa occid. : Sierra Leone; Afr. aust. : P[t]-Elizabeth.

Pœcilorchestes decoratus sp. nov. — ♂. Long. 3,4 mill. — Cephalothorax niger, valde et uniformiter clathrato-rugosus, supra cinereo in lateribus cyaneo brevissime et parce pilosus, parte cephalica utrinque, inter oculos, macula longa obliqua et leviter curvata, parte thoracica, pone oculos, macula minore et extus prope oculos posticos macula majore et ovata, nitidissime albo-argenteo-squamulatis læte decoratus. Abdomen nigerrimum, opacum, maculis albo-argenteis quatuor magnis et fere æquis, in quadratum

ordinatis, supra ornatum. Sternum nigrum, albo-squamulatum. Chelæ breves, robustæ, nigræ, rugosæ, in parte apicali depressa et dente apicali obtuso et teretiusculo armatæ, ungue longo et valido, ad basin abrupte incrassato et obtuse anguloso. Pedes fusco-picei, supra albo-pubescentes, metatarsis tarsisque sex posticis et tibiis quatuor posticis ad apicem flavis. Pedes-maxillares graciles fusco-picei. — N. Guinea : Dorey.

Omœdus piceus sp. nov. — ♂ ♀. Long. 5 mill. — Cephalothorax niger, nitidus, subtilissime coriaceus, parcissime et tenuiter cinereo-pilosus. Abdomen fusco-testaceum, paululum micans parce pilosum. Chelæ sat latæ sed brevissimæ, nigræ, valde coriaceæ. Pedes fusco-picei, tarsis metatarsis, basi excepto, apice tibiarum sex posticorum pallide testaceis. Pedes-maxillares maris parvi, fusco-picei; patella haud longiore quam latiore; tibia breviore, apophysi apicali, gracili aciculata et recta extus instructa; tarso angusto teretiusculo; bulbo simplici. — Ins. Halmahera.

Margaromma marginatum sp. nov. — ♂. Long. 7,5 mill. — Cephalothorax niger, sublævis, parte cephalica antice et utrinque vitta lata albo-pilosa marginata, thoracica lineis radiantibus exilibus et abbreviatis albo-pilosis ornata. Clypeus fere nudus, oculis mediis non multo angustior. Abdomen anguste ovatum, postice acuminatum, supra nigrum, vitta marginali integra lata et prope medium linea transversa recta exiliore albo-pilosis ornatum, subtus atrum, regione epigasteris testacea. Chelæ latæ, antice deplanatæ et leviter depressæ, nigro-æneæ, valde rugato-striolatæ. Sternum fuscum læve. Pedes nigricantes vel fusco-olivacei, coxis tarsisque cunctis luteis, trochanteribus femoribus ad basin, præsertim supra, metatarsis tarsisque sex posterioribus luteis, metatarsis utrinque nigricanti-lineatis. Pedes-maxillares nigricantes, graciles; tibia cylindracea mutica, patella breviore; tarso angusto longo, longe acuminato et bulbum, simplicem et ovatum, multo superante. — Australia orient. : Cook-Town.

M. soligena sp. nov. — ♂. Long. 8 mill. — Cephalothorax lævis, niger, postice dilutior et piceus, parte cephalica, utrinque, inter oculos, macula obliqua, thoracica, pone oculos, vitta transversa leviter recurva læte argenteo-micanti-squamulatis ornatis. Pili oculorum lutei, pauci et breves. Clypeus fere glaber. Abdomen ovatum, postice acuminatum, supra atrum, ad marginem anticum linea arcuata, prope medium linea transversa subrecta, dein lineis obliquis binis postice valde convergentibus, albo-squamulatis decoratum, subtus atrum, utrinque testaceo-marginatum. Partes oris sternumque nigro-picea. Chelæ longæ sed verticales, extus ad basin

carinatæ, antice æneæ, nitidæ, transversim subtiliter et crebre striolatæ et intus minute et parce albo-squamulatæ, subtus marginibus sulci longis et carinatis ad angulum in tuberculum magnum et obtusum prominentibus, ungue sat longo. Pedes longi, parum robusti, fusco-picei, supra parce albo-squamulati, coxis, metatarsis tarsisque sex posticis fulvis, femoribus posticis subtus ad basin fulvo-notatis. Pedes-maxillares castanei, graciles et longissimi, cephalothorace multo longiores; patella saltem triplo longiore quam latiore; tibia patella saltem 1/3 longiore, paulo graciliore, tereti, subtus ad apicem leviter convexa, extus apophysi parva gracili divaricata et curvata munita; tarso tibia haud vel vix latiore, multo breviore, apice longe acuminato; bulbo parvo, ovato, dimidium basale tarsi tantum occupante; tibia et præsertim tarso intus longissime sed parum dense crinitis. Laminæ extus dente acuto et recto instructæ. — N. Guinea : Dorey (Laglaize).

M. torquatum sp. nov. — ♂. Long. 8 mill. — Cephalothorax niger postice paulo dilutior, parte cephalica macula media frontali et utrinque, inter oculos, macula obliqua, thoracica antice vitta transversa recurva, dein lineolis radiantibus numerosis albo-argenteo-squamulatis decoratis. Pili oculorum et supra et subtus albi, inter oculos fulvo-rufuli. Clypeus parce albo-pilosus. Abdomen sat angustum, postice acuminatum, fusco-testaceum, supra in medio late dilutius, in parte basali linea marginali arcuata, in medio linea transversa subrecta, postice lineis longitudinalibus binis nodosis vel maculis parvis biseriatis albo-argenteo-squamulatis decoratum, subtus omnino pallide luteum. Sternum fusco-rufulum. Partes oris nigro-piceæ. Chelæ nigro-æneæ, sat longæ et angustæ, intus emarginatæ, extus haud carinatæ sed grosse transversim plicatæ, antice deplanatæ et coriaceæ, subtus marginibus sat brevibus sed ad angulum leviter prominulis et tridentatis. Pedes longi et graciles, fulvo-rufuli, micanti-tincti, patellis supra tibiisque ad apicem squamulis micantibus ornatis. Pedes-maxillares fulvi, graciles modice longi; tibia patella breviore sed paulo longiore quam latiore, tereti, extus ad apicem apophysi parva, gracillima et acuta, antice directa, armata; tarso tibia haud latiore, sat longo, longe attenuato; bulbo parvo, simplici et ovato, dimidium basale tarsi tantum occupante. Laminæ extus muticæ et rotundæ. — Ins. Halmahera : Edkor.

Ælurillus cristatopalpus sp. nov. — ♂. Long. 4 mill. — Cephalothorax niger, pilis rubris albisque mixtis crebre vestitus, parte cephalica in medio maculis vel vittis binis ovatis fuscis notata, antice pilis læte coccineis, ad marginem frontalem longioribus sed setis erectis nigris intermixtis, ornata, parte thoracica

linea marginali exili albido-luteo-pilosa cincta et area media magna subtriquetra rarius pilosa et fere nigra, sed linea exili et abbreviata albido-pilosa secta, notata. Pili oculorum et clypei coccinei sed sub oculis mediis pilis albis paucis mixti. Abdomen breve, supra crebre rubro-albido-pubescens, antice vittis binis fuscis abbreviatis, punctos albidos includentibus, ornatum, subtus luteum et albo-pubescens. Chelæ sternumque nigra, parce albo-pilosa. Pedes lutei, albo-rubroque pilosi, quatuor antici breves et robusti fere concolores, quatuor postici multo longiores, valde nigricanti - variati et subannulati. Pedes-maxillares breves et robusti, nigri; femore curvato, supra ad apicem, pilis albidis crassis longis erectis sed apice incurvis cristato; patella tibiaque supra et extus rubro-pilosis sed intus intense nigris, tarso nigro, sed extus ad basin pilis crassis et longis ad basin rubris ad apicem albido-luteis ornato; bulbo nigro, maximo, sub tibia et patella late producto.

♀. Long. 4,5 mill. — Cephalothorax niger, pilis fulvo-rufulis albidisque mixtis crebre vestitus, parte cephalica antice lætius pilosa et setis nigris erectis fere spiniformibus echinata, parte thoracica utrinque, prope marginem, longius albo-pilosa. Pili oculorum læte fulvo-rufuli, pili clypei crassi et longi albi pilis rufulis paucis intermixti. Abdomen magnum, antice leviter emarginatum, supra cinereo-rufulo-pubescens, in medio latissime infuscatum, sed vitta media paulo dilutiore, punctis fuscis albidisque marginata notatum, utrinque zonis obliquis fusco-punctatis, sensim evanescentibus, segmentatum, subtus luteum et albo-pilosum. Pedes lutei, femoribus quatuor anticis annulo apicali, posticis annulis binis latis, subtus nigris supra dilutioribus, notatis, reliquis articulis, tarsis exceptis nigricanti-variatis et subannulatis. — Africa australis : Vryburg! Kimberley!

Stenælurillus leucogramma sp. nov. — ♀ (pullus). Long. 4 mill. — Cephalothorax niger, nigro-pubescens, parte cephalica setis erectis rigidis crebre spinulosa, thoracica linea marginali lineisque dorsalibus binis angustis antice oculos dorsales attingentibus, postice convergentibus, ornata. Pili oculorum pallide fulvo-rufuli. Clypeus dimidio oculorum mediorum multo latior, testaceus, crebre et longe albo-barbatus. Oculi antici apicibus in lineam rectam, laterales a mediis bene sejuncti. Abdomen breviter ovatum, supra nigerrimum, anguste albo-marginatum et linea media nivea integra et angusta sectum, subtus albido-luteum albo-sericeo-pubescens, mamillæ pallide luteæ, superiores leviter infuscatæ. Chelæ breves, fuscæ, antice coriaceo-granulosæ et albo-hirsutæ, marginibus sulci brevissimis, inferiore mutico, superiore dentibus parvis binis geminatis munito. Partes oris sternumque pallide-lutea, albo-pilosa. Pedes antici breves et robusti, postici

multo longiores sed inter se subæquales, coxis femoribusque luteis, femoribus apice late nigro-annulatis, supra et intus nigricanti-plagiatis, reliquis articulis obscure fulvis patellis tibiisque anticis nigricanti-variatis, posticis cum metatarsis fere omnino nigricantibus, metatarsis anticis tarsis brevioribus, subtus aculeis 2-2, præsertim basilaribus, longissimis et utrinque aculeo laterali apicali instructis. — Africa australis : Maschonaland (Mus. Peckh.); Matabeleland (Penther, 1896).

Pensacola cyaneochirus sp. nov. — ♂. Long. 5,5 mill. — Cephalothorax niger, parte cephalica crebre et longe albido-luteo-pubescente, thoracica supra parce rubro-pilosa, utrinque, in declivitate, glabra sed vitta media lata albido-luteo-pilosa ornata. Pili oculorum aurantiaci. Pili clypei densi nivei. Oculi antici viridi-cuprei. Quadrangulus oculorum postice quam antice evidenter angustior sed postice cephalothorace haud angustior. Abdomen nigrum, supra fulvo-pubescens, vitta media lata, postice leviter dentata, testacea et albo-pilosa ornatum, subtus parce albo-pilosum. Chelæ, partes oris sternumque nigra, metatarsis tarsisque quatuor posticis fulvis, metatarsis apice fuscis. Pedes antici reliquis robustiores, femoribus compressis et clavatis, cuncti supra parce fulvo-pilosi, subtus glabri et nitidi. Pedes-maxillares nigerrimi, cyaneo-tincti, supra glabri et nitidi; femore compresso et curvato; patella subquadrata; tibia brevi, transversa annuliformi, apophysi gracili, antice oblique directa, recta, apice minute et inæqualiter bidentata extus armata; tarso magno, late et obtuse ovato, supra omnino plano et disciformi; bulbo magno, ad basin longe retro producto, haud attenuato, sed oblique secto, apice stylo valido, circulum formante, munito. — Ecuador merid. : Loja (Gaujon).

P. Gaujoni sp. nov. — ♂. Long. 6,5 mill. — Cephalothorax fusco-castaneus, utrinque late niger, pilis longis pronis fulvis rufulisque crebre vestitus et linea marginali albo-pilosa cinctus. Pili oculorum albi. Clypeus fere glaber. Abdomen oblongum, supra atrum, fulvo-nitido albo rufuloque pubescens, vitta media dilutiore et albidius pilosa, in medio valde ampliata et triquetra ornatum, subtus fulvo-testaceum, parce nigricanti-punctatum. Chelæ, partes oris sternumque fulvo-rufula. Chelæ glabræ, leviter transversim striolatæ, latæ et leviter divaricatæ, margine inferiore dente angulari valido et prominulo armato. Pedes fusco-castanei, coxis femoribusque dilutioribus, his nigricanti subannulatis, metatarsis luteis ad basin atque ad apicem late nigro-annulatis, tarsis luteis apice minute nigris. Pedes-maxillares graciles, femore patellaque fulvis albo-hirsutis, tibia tarsoque nigris; tibia patella vix breviore cylindracea, apophysi apicali longa, gracili, acuta et antice directa

armata; tarso angusto, tibia cum patella haud longiore; bulbo longo, apice truncato et stylo, circulum formante, munito, ad basin longe retro producto et ampliato. — Ecuador merid. : Amaluza (Gaujon).

P. castanea sp. nov. — ♂. Long. 5,4 mill. — Cephalothorax læte rufo-castaneus, nitidus, parte thoracica infuscata, parte cephalica prope oculos nigricanti, rufo-pubescens, vitta marginali latissima, macula frontali muculaque thoracica magna subtriangulari albo-niveo-pilosis ornatus. Pili oculorum supra et extus læte rufi in medio albi. Pili clypei albo-nivei. Abdomen fulvo-testaceum, punctis et lineis transversis olivaceis parum expressis notatum, supra fulvo antice albo-pubescens. Chelæ longæ, fuscæ, intus emarginatæ, antice valde ruguloso-striatæ et in parte basali crasse albo-pilosæ. Pedes obscure fulvo-olivacei, antici, præsertim femoribus, infuscati et nigro-pilosi. Pedes-maxillares sat breves et robusti, fusco-castanei, femore supra ad apicem et patella intus crasse albo-niveo-pilosis patella extus coccineo-pilosa, articulis reliquis nigro vel cinereo-setosis; tibia patella paulo breviore, angustiore, subtus pone basin, ad marginem interiorem, apophysi magna, fulva et conica, extus apophysi apicali minore, nigra, acuta et divaricata armata; tarso angusto; bulbo longo ad basin convexo.

♀. Long. 6 mill. — Cephalothorax fulvo-rufescens, parte cephalica utrinque nigra, vitta marginali albida latissima cinctus. Pili oculorum et clypei albi, prope oculos laterales extus pilis coccineis paucis intermixti. Abdomen latius ovatum, supra testaceum, in parte prima lineis transversis olivaceis binis valde arcuatis (2ª sæpe interrupta) et linea media exili sed postice transversim dilatata, prope medium vitta transversa lata nigricanti, maculam minorem transversam testaceam includente, dein macula olivacea minore triquetra vel rhomboidali notatum, subtus in medio late infuscatum. Pedes fulvi, fusco-annulati. Pedes-maxillares albo-testacei, albido-pilosi. Area genitalis foveis binis rotundis tenuiter marginatis et a sese anguste sejunctis notata. — Brasilia : Tijuca prope Rio (E. Gounelle).

P. ornata sp. nov. — ♀. Long. 5 mill. — Cephalothorax brevis et altissimus, parte cephalica viridi-aureo-pilosa, thoracica macula media parva longa vittaque marginali latissima albo-pilosis ornata. Pili oculorum aurantiaci. Pili clypei pauci, longi, sordide albidi. Abdomen oblongum, postice acuminatum, nigrum, vitta latissima integra fulva, antice viridi-micanti postice fulvo-pubescenti, utrinque maculis longis et obliquis niveis ornatum et postice, supra mamillas fasciculo pilorum alborum munitum, subtus fusco-

testaceum parce albo-pilosum. Sternum nigricans. Pedes fulvi, femoribus quatuor anticis usque ad basin posticis in dimidio apicali nigricantibus, patellis tibiisque anticis rufo-brunneis, posticis parum distincte annulatis. Area genitalis minuta, subrotunda, leviter biimpressa. — Le Para (de Mathan).

P. murina sp. nov. — ♂. Long. 6,8 mill. — Cephalothorax fuscus, antice dilutior et rufescens, rufulo-pubescens, parte cephalica utrinque et antice, prope oculos laterales, late albo-pilosa, thoracica vitta media abbreviata vittaque marginali latissima, postice interrupta, niveis ornata. Pili oculorum utrinque albi, inter oculos medios rufuli. Clypeus fere glaber, parce setosi. Abdomen crebre albido-pubescens, vitta media fusca, angusta, postice acuminata et abbreviata supra notatum, subtus nigricans, late albido-marginatum. Sternum nigrum albo-pilosum. Pedes obscure fulvi, albo-pilosi, antici, tarsis exceptis, infuscati. Pedes-maxillares fulvi apice fusci, albo-pilosi, sed intus nigro-setosi; tibia patella breviore et paulo angustiore, apophysi apicali minuta, gracili sed obtusa, antice oblique directa, extus instructa.

♀. Long. 7 mill. — Cephalothorax fusco-rufescens, antice prope oculos niger, albido fulvoque pubescens. Pili oculorum sordide albidi et fulvi. Pili clypei longi albidi. Abdomen breve, supra crebre fulvo-albido-pubescens et lineolis transversis numerosis valde flexuosis fuscis ornatum, subtus obscure fulvum, parce albo-pilosum. Pedes breves, obscure fulvi, albo-pubescentes, confuse fusco-annulati. Plaga genitalis magna, semicircularis, nitida, fulva, postice sensim infuscata, septo angusto rufulo secta. — Brasilia : Le Para, Teffé (de Mathan).

Thyene vittata sp. nov. — ♂. Long. 7-8 mill. — Cephalothorax fusco-castaneus, prope oculos niger, macula frontali magna, utrinque sub oculis vitta longitudinali, vittaque thoracica lata albo-luteo-squamulatis ornatus. Pili oculorum obscure rubri. Clypeus fere glaber. Abdomen testaceum, utrinque valde striolatum et punctatum, vitta media lata dilutiore, albo-nitido squamulata supra ornatum, subtus vitta latissima obscuriore notatum. Chelæ nigro-æneæ, valde coriaceo-rugatæ. Sternum fusco-olivaceum. Pedes antici fusci, coxis metatarsis tarsisque luteis. Pedes postici lutei, femoribus ad apicem late infuscatis, patellis tibiisque late annulatis. Pedes-maxillares fusco-castanei; tibia brevi, apophysi simplici et acuta, antice oblique directa, extus armata; tarso ovato, extus dilatato; bulbo stylo longo spirali munito.

♀. Long. 8 mill. Cephalothorax pallide luteus, parce nigro-pilosus, parte cephalica albido-luteo-squamulata et maculis ocularibus parvis nigris notata. Pili oculorum flavidi. Clypeus ad marginem

parce et longe albo-barbatus. Abdomen supra rubro-aurantiacum, vitta media lata integra dilutiore pallide luteo-squamulata et tenuiter nigro-marginata ornatum, subtus luteum, mamillis anguste nigro-cinctis. Partes oris, sternum pedesque pallide lutea, femoribus anticis antice crebre et regulariter transversim nigro-striatis. Plaga genitalis rufula, nitida, late cordiformis et postice emarginata, antice plagula obscuriore ovato longitudinali munita. — Natal (Dr C. Martin).

T. coronata sp. nov. — ♂. Long. 7-8 mill. — Cephalothorax rufescens, parte cephalica infuscata prope oculos nigra, thoracica versus marginem sensim infuscata, squamulis latis fulvo-nitidis albidisque vestitus. Pili oculorum aurantiaci. Clypeus albo-nitido-squamulatus. Abdomen supra atrum, in medio paulo dilutius, antice macula magna semicirculari, postice macula magna obtuse triquetra, in medio linea transversa, grosse luteo-argenteo-squamulatis, ornatum, subtus atrum utrinque dilutius et parce albo-squamulatum. Chelæ antice nigro-æneæ, glabræ, valde coriaceo-rugatæ. Sternum fuscum vel luteum. Pedes antici robusti, rubro-castanei, femoribus nigris, patellis tibiisque subtus nigricantibus, haud ciliatis, metatarsis tarsisque luteis, metatarsis apice fusco-annulatis. Reliqui pedes lutei, femoribus ad apicem (præsertim 2i paris) late infuscatis. Pedes-maxillares fusco-castanei, fere præcedentis sed apophysi tibiali paululum divaricata, acuta, intus in medio minutissime dentata. — Africa austro-orient : Natal, Zululand (Dr C. Martin).

Thyenula (1) **juvenca** sp. nov. — ♂. Long. 5 mill. — Cephalothorax lævis, nitidus, fulvo-rufescens, prope oculos niger, parte cephalica ad marginem frontalem et utrinque albo rubroque pilosa, præterea cum parte thoracica glabra. Pili oculorum albi, supra oculos medios aurantiaci. Clypeus parce et longe albo-barbatus. Abdomen oblongum, omnino albido-testaceum fere nudum. Chelæ verticales, latæ, fulvo-rufulæ, ad basin infuscatæ. Partes oris sternum pedesque fulvo-testacea, parte labiali fusco-olivacea, tibiis metatarsisque anticis vix obscurioribus, tibia 1i paris aculeis inferioribus validis et longis 3-3 aculeoque laterali interiore, tibia 2i paris subtus aculeis exterioribus trinis, medio reliquis longiore, aculeo interiore subapicali, aculeoque parvo laterali-interiore, instructis. Pedes-maxillares sat graciles, lutei parce albo-pilosi, femore intus infuscato ; femore gracili, arcuato, subtus subcarinato; tibia patella paulo breviore, extus apophysi apicali nigra leviter extus arcuata, gracili sed obtusa et intus minutissime granosa,

(1) **Thyenula** nov. gen. A *Thyena* differt oculis anticis apicibus in lineam rectam, tibiis metatarsisque anticis aculeis seriatis longioribus subtus armatis. — Typus : *T. juvenca* E. Sim.

instructa; tarso anguste ovato; bulbo sat longo, ad basin acuminato et breviter producto, ad apicem stylo, circulum formante, munito. — Africa austr. : P^t Elizabeth.

Baryphas (1) **ahenus.** — ♂. Long. 7-8 mill. — Cephalothorax niger, lævis, antice atque in medio obscure cinereo-nitido squamutatus, parte thoracica linea marginali angusta albo-pilosa cincta. Pili oculorum et clypei longi densi subsquamiformes, cinereo-argentei. Abdomen breviter ovatum, nigrum et supra et subtus squamulis grossis subrotundis olivaceo-nitidis-vestitum, supra puncto medio, utrinque prope medium linea parva obliqua, postice linea transversa subrecta, interdum curvata et semicirculari, albo-squamulatis, ornatum. Sternum nigrum, albo-squamulatum. Chelæ crassissimæ, apice attenuatæ, antice glabræ, leviter convexæ, subtiliter coriaceæ sed prope apicem sublæves, subtus glabræ, marginibus sulci brevissimis, dentibus parvis armati, ungue brevi sed crassissimo et curvato. Pedes robusti, nigri, nigro-hirsuti et parce albido-squamulati, aculeis fuscis numerosis armati. Pedes-maxillares nigri, nigro-hirsuti et parce albo-squamulati; tibia patella circiter æquilonga, apophysi apicali, antice oblique directa, recte truncata cum margine minutissime serrulata, extus armata; tarso ovato; bulbo ovato, ad basin parum producto et obtusissimo, intus stylo libero marginato.

♀. Long. 7-8 mill. — Cephalothorax niger, lævis, supra rufulo utrinque in declivitate albido-pubescens. Pili oculorum cinereo-rufuli. Abdomen nigrum, supra æneo-micanti-squamulatum, vitta marginali lata utrinque intus laciniosa et bidentata albido-roseo-squamulata, puncto medio et postice utrinque linea obliqua albidioribus, subtus utrinque vitta integra, antice in medio vitta latiore abbreviata luteo-micanti-squamulatis ornatum. Chelæ convexæ, nigræ, in dimidio basali crasse luteo-nitido-squamulatæ. Sternum pedesque nigricantia, coxis tarsisque dilutioribus et rufescentibus, pedes luteo-squamulati et subannulati. Plagula genitalis rufula, nitida, fere semicircularis et transversa, antice foveola testacea trapezoidali, septo angusto divisa, notata.

Var. Abdominis vitta marginali lineæque medianæ splendide rubro-coccineæ. — Africa australis et austro-orientalis.

B. Jullieni sp. nov. — ♂. Long. 5 mill. — Cephalothorax niger, lævis, olivaceo-nitido-squamulatus, margine frontali albo-luteo-squamulata et parte thoracica vitta latissima, postice inter-

(1) **Baryphas** nov. gen. Ab *Hyllo* imprimis differt chelis (fere *Mollicæ*) conicis, marginibus sulci brevissimis, inferiore dente parvo et gracili, prope radicem unguis sito, munito, ungue brevi et robusto. — Typus : *B. ahenus* E. S.

rupta, niveo-squamulata cincta. Pili oculorum et clypei densissimi albido-lutei, sub oculis albi. Abdomen oblongum, nigrum, olivaceo-micanti-squamulatum et pone medium utrinque vitta nivea abbreviata et obliqua ornatum, subtus grosse cinereo-argenteo-squamulatum. Chelæ sat breves, nigro-æneæ, coriaceæ, intus ad basin longe albido-crinitæ. Sternum nigrum. Pedes robusti, nigri, crebre et longe nigro-hirsuti, femoribus crebre reliquis articulis parce albo-nitido squamulatis. Pedes-maxillares nigri, nigro-hirsuti; tibia patella breviore, extus ad apicem apophysi conica sed acuta, antice oblique directa, armata; tarso sat anguste ovato; bulbo simplici, disciformi, ad basin acuminato. — Liberia : Monrovia (Jullien).

B. eupogon sp. nov. — ♂. Long. 5 mill. — Cephalothorax niger, lævis, olivaceo-nitido squamulatus, parte thoracica antice paulo dilutiore rufescenti-tincta et linea semicirculari albo-squamulata sat angusta ornata. Pili oculorum pauci. Pili clypei flavido-nitidi, densissimi, præsertim ad marginem longissimi et decumbantes. Abdomen oblongum, nigro-castaneum (fere depile) cinereo-nitido squamulatum et utrinque, in parte apicali, lineis obliquis, antice convergentibus, testaceis et albo-squamulatis ornatum. Sternum nigrum. Chelæ nigræ, apice rufulæ, antice coriaceæ et pilis flavido-nitidis, depressis sed longissimis, fere usque ad apicem crebre vestitæ. Pedes robusti, nigri vel castanei, coxis, metatarsis tarsisque paulo dilutioribus et rufescenti-tinctis, præsertim antici crebre et longe nigro-hirsuti, femoribus anticis intus, reliquis articulis supra parce albo-squamulatis. Pedes-maxillares nigri, patella sæpe dilutiore, femore ad apicem patella tibiaque supra tarso ad basin squamulis grossis et obtusis albido-argenteis et micantibus crebre vestitis; tibia patella breviore, extus ad apicem apophysi conica sed acuta, antice oblique directa, munita; tarso sat anguste ovato; bulbo simplici ad basin acuminato. — Ins. S. Thome (Mocquerys).

A *B. Jullieni* præsertim differt pedibus-maxillaribus supra læte squamulatis, pilis clypei omnino flavidis, chelis fere usque ad apicem creberrime flavido-nitido hirsutis subsquamulatis.

Polemus (1) **chrysochirus** sp. nov. — ♀. Long. 4 mill. — Cephalothorax longus, postice valde, fere abrupte, declivis, niger, subtiliter rugosus et squamulis grossis cinereo-fulvis vestitus. Pili oculorum squamiformibus rufulis. Clypeus basique chelarum patella tibiaque pedum-maxillarium, squamulis grossis pediculatis splendide viridi-aureis crebre vestiti. Abdomen oblongum, nigrum,

(1) **Polemus** nov. gen. A *Barypha* differt area oculorum dorsalium parallela, cephalothorace longo, subparallelo, superne deplanato sed postice abrupte declivi et verticali. — Typus : *P. chrysochirus* E. Simon.

cinereo-olivaceo subæneo squamulatum, supra antice arcu marginali, prope medium arcu acute-auguloso, postice lineolis transversis binis exilibus, aurantiaco-squamulatis, ornatum. Pedes nigri, metatarsis tarsisque anticis, tarsis posticis dilutioribus et rufulis, patella tibiaque anticis fulvo-aureo-squamulatis, posticis lineis albo-squamulatis ornatis. Plaga genitalis nigra, subrotunda, convexa et nitida, fovea magna impressa. — Sierra-Leone : Free-Town.

P. squamulatus sp. nov. — ♂. Long. 4 mill. — Cephalothorax fere præcedenti, niger, fere lævis (fere omnino depilis) squamulis luteo-albidis, ad marginem frontalem longioribus, vestitus. Pili oculorum et clypei, longi et obtusi, luteo-albidi, nitidi. Abdomen nigrum, supra squamulis cinereo-olivaceis æneo-tinctis, subtus squamulis albido-micantibus vestitum. Chelæ nigræ, coriaceæ, ad basin valde luteo-pilosæ. Sternum pedesque nigra, parce albo-squamulata. Pedes-maxillares breves, nigri, nigro-cinereo-hirsuti. — Sierra-Leone : Free-Town.

P. galeatus sp. nov. — ♀. Long. 3 mill. — Cephalothorax altissimus superne deplanatus, declivitate postica excavata sed apice valde prominula et obtusa, niger, subtilissime, vix distincte, rugosus, squamulis cinereis vestitus et linea alba tenui marginatus. Pili oculorum et clypei pauci cinerei. Abdomen sat angustum, nigrum, superne duriusculum et coriaceum, squamulis latis cinereo-olivaceis crebre vestitum. Chelæ nigræ, coriaceæ fere glabræ. Pedes nigri, tarsis posticis paulo dilutioribus, niveo-squamulati. Pedes-maxillares breves, nigri, femore, patella tibiaque supra albos-quamulatis. — Sierra-Leone : Free-Town.

Vinnius (1) **calcarifer** sp. nov. — ♂. Long. 6 mill. — Cephalothorax rubro-castaneus, maculis ocularibus nigris parvis notatus (fere omnino depilis), parte cephalica antice et utrinque rubro-pilosa, thoracica macula media albo-pilosa ornata. Pili oculorum fulvo-rufuli. Clypeus altus, glaber, infuscatus. Abdomen longum, pallide testaceum, supra nitidum et fere glabrum sed antice arcu lato, albo-piloso cinctum, subtus concolor. Chelæ rufulæ, valde coriaceæ, antice planæ et leviter sulcatæ, extus, prope apicem, dente valido et longo, valde uncato, instructæ. Partes oris nigricantes, laminæ extus angulosæ haud dentatæ. Sternum pedesque antici fusco-rufula vel castanea, tarsis dilutioribus. Pedes postici lutei. Pedes-maxillares fusco-rufuli, patella lutea crasse et longe niveo-hirsuta, tarso nigro-piloso; tibia patella breviore et angus-

(1) **Vinnius** nov. gen. A *Viciria* differt area oculorum dorsalium vix angustiore postice quam antice, clypeo maris latissimo et fere nudo, chelarum marginibus longis dentibus remotis. — Typus : *V. maculaticeps* E. Simon.

tiore, apophysi apicali longa, acuta et recta, antice directa, intus, prope medium, minute dentata, extus armata; tarso mediocri, ovato et obtuso; bulbo ovato, stylo apicali brevi sed robusto et valde uncato munito. — Brasilia : Theresopolis prope Rio (Brunet).

V. carinatus sp. nov. — ♂. Long. 7 mill. — Cephalothorax pallide fusco-rufescens, marginem versus sensim obscurior, maculis ocularibus nigris parvis notatus, parte cephalica utrinque, inter oculos, albo-luteo-pilosa, parte thoracica macula media magna, obtuse triquetra, albido-pilosa, ornata. Pili oculorum pauci et breves, obscure rubri. Clypeus latus et depressus, oculis mediis vix 1/3 angustior fere nudus. Oculi antici magni et a sese subcontigui, apicibus in lineam subrectam. Abdomen pallide fusco-testaceum, antice arcu lato luteo dein lineis exilibus binis parallelis longitudinalibus et utrinque lineis obliquis albido-pilosis decoratum, subtus vitta lata nigricanti notatum. Chelæ fuscæ, subtiliter coriaceæ et transversim rugatæ, verticales, extus in parte apicali convexæ et læviores, antice deplanatæ sed costis binis munitæ, margine superiore sulci brevi, dente valido armato, ungue valde curvato, supra incrassato et leviter canaliculato. Partes oris nigricantes, testaceo-marginatæ. Sternum fusco-testaceum. Pedes antici fusco-castanei, femoribus nigricantibus, metatarsis tarsisque fulvis, patella longa intus minute uniaculeata, tibia aculeis inferioribus 3-3 aculeisque lateralibus interioribus subapicalibus munita. Pedes postici, femoribus exceptis, dilutiores, coxis tarsisque luteis. Pedes-maxillares fusco-castanei; tibia patella breviore et angustiore apophysi apicali antice directa, apice uncata et acuta, extus armata; tarso mediocri parum attenuato; bulbo disciformi, rotundo, nigro, stylo libero longo omnino circumdato. —Venezuela : Colonia Tovar!

V. uncatus sp. nov. —♂. Long. 7 mill. — Cephalothorax fusco-castaneus, utrinque, prope oculos, atque in declivitate fere niger (fere omnino depilis) saltem ad partem albo-pilosus. Pili oculorum in medio albi extus rufuli. Clypeus latus fere glaber. Abdomen sat angustum et longum, pallide luteo-testaceum, albo-pubescens, supra vittis duabus sinuosis apice attenuatis, subtus vitta latiore nigricantibus, notatum. Mamillæ mediæ albidæ, reliquæ fuscæ. Chelæ fuscæ, leviter æneo-tinctæ, subtilissime striolatæ, antice, et intus et extus, carinatæ, margine inferiore sulci longo sed subtransverso dente remoto, ungue in parte basali crasso cylindrato et subrecto, in parte apicali angustiore compresso et curvato, supra, prope medium, dentato. Pedes longi fulvo-lutei, antici, femoribus exceptis, leviter infuscati. Pedes-maxillares fulvi apice infuscati; tibia patella multo breviore, apophysi nigra obtusa et curvata extus armata; tarso ovato; bulbo simplici disciformi. — Brasilia : Bahia.

V. maculaticeps sp. nov. — ♂. Long. 6,7 mill. Cephalothorax fusco-rufescens prope oculos et versus marginem niger, nitidus sed subtiliter coriaceo-reticulatus, prope oculos aurantiaco-pilosus, antice inter oculos macula magna dein macula minore albido-flavescenti pilosis ornatus. Oculi antici inter se subcontigui, in lineam rectam, pilis rufulis cincti. Clypeus glaber, altissimus (oculis mediis vix angustior), depressus et subtiliter striatus. Abdomen parvum, postice acuminatum, fulvum, albo-pubescens, supra vittis fuscis binis interruptis; subtus vitta latissima obscure fulva notatum. Sternum fusco-rufescens nitidum. Chelæ sat longæ, parallelæ, antice fere planæ, in parte basali coriaceæ, in parte apicali fere læves, extus carinatæ atque ad apicem, prope radicem unguis, apophysi conica divaricata et paululum uncata armatæ, ungue supra, prope medium dentato. Pedes sat longi, flavidi, femoribus, præsertim anticis, apice anguste fuscis, patellis tibiisque anticis fere nigris in medio albo-pilosis, posticis leviter infuscatis, metatarsis anticis infuscatis apice late fusco-annulatis, tibiis anticis aculeis longis inferioribus 3-3 et intus aculeis minoribus binis armatis. Pedes-maxillares longi et tenues; femore longo, gracili, paululum curvato; patella plus duplo longiore quam latiore; tibia patella breviore et paulo graciliore, apophysi apicali nigra acute triquetra munita et subtus paululum prominula; tarso minuto, intus valde ciliato; bulbo simplici disciformi.

♀. Long. 8,5 mill. — Cephalothorax flavido-testaceus regione oculari castanea prope oculos nigra, parce coccineo-pilosa, antice macula magna subtriquetra, postice macula minore elongata et utrinque maculis binis albo-pilosis ornata. Pili oculorum supra oculos pallide flavi subtus albi. Clypeus nudus, dimidium oculorum vix æquans. Abdomen obscure fulvum, parce albido-pilosum, supra maculis nigricantibus, biseriatis, obliquis atque in lateribus productis, subtus vitta lata obscuriore sed antice evanescente notatum. Chelæ, sternum, pedes et pedes-maxillares pallide flavo-testacea. Pedes breviores et robustiores, tibia 1^{i} paris aculeis lateralibus carente, tibia 2^{i} paris aculeo laterali apicali munita. Area genitalis parva, fusca, antice fovea profunda rotunda vel antice obtuse secta, tuberculum humile includente, notata. — Brasilia : Terra Nova prope Bahia (E. Gounelle).

Viciria diademata sp. nov. — ♂. Long. 9 mill. — Cephalothorax fusco-rufescens, prope oculos niger, crebre coccineo-pubescens, parte cephalica macula magna, thoracica vitta marginali latissima, postice interrupta, niveo-squamulatis decoratus. Pili oculorum supra oculos et in medio læte rufi subtus albi. Clypeus crebre et longe albo-pilosus. Abdomen angustum, postice longe acuminatum, nigrum, supra obscure rufo-pubescens, vitta integra,

postice sensim attenuata, niveo-squamulata sectum, subtus parce cinereo-pilosum. Chelæ verticales parallelæ, nigro-nitidæ, confuse et parce transversim striolatæ, prope basin setis longissimis albis paucis munitæ. Pedes longi, sex antici fusco-rufescentes, metatarsis saltem ad apicem fulvis, tarsis quatuor anticis nigricantibus, tarsis 3[i] paris flavidis, tibiis quatuor anticis subtus crebre et regulariter nigro-fimbriatis, pedes 4[i] paris flavi. Pedes-maxillares parum longi et parum robusti, obscure fulvi, albo-pilosi, femore ad basin tarsoque infuscatis; patella parallela, longiore quam latiore; tibia patella vix breviore et vix angustiore, apophysi apicali gracili, oblique divaricata, apice abrupte angustiore cum angulo interiore paululum producto armata; tarso sat anguste ovato; bulbo simplici disciformi. — India : Pondichery (M. Maindron).

V. polysticta sp. nov. — ♂. Long. 6 mill. — Cephalothorax fusco-rufescens prope oculos niger, postice sensim dilutior, parte cephalica in dimidio anteriore squamulis albo-nitidis, vittam transversam latissimam designantibus, ornata, parte thoracica macula anteriore magna subquadrata vittaque marginali latissima, postice interrupta, niveo-squamulatis decorata. Pili oculorum obscure fulvi. Clypeus crebre albo-nitido-pilosus. Abdomen angustum, postice acuminatum, fulvo-rufulum, supra vittis binis integris et parallelis albis ornatum, subtus fulvo-testaceum, utrinque linea exili alba marginatum. Chelæ fere nigræ, leviter æneo-tinctæ, vix rugatæ. Sternum fulvum, parce albo-nitido-squamulatum. Partes oris fusco-testaceæ. Pedes lutei, pedes 1[i] paris femore subtus infuscato fere nigro, patella tibiaque leviter infuscatis, tibia haud fimbriata, metatarso longo, subtus aculeis 2-2, apicalibus parvis et utrinque prope basin aculeo laterali parvo instructo. Pedes-maxillares lutei, albo-pilosi; femore valido curvato; tibia patella breviore, cylindrata, extus ad apicem apophysi fere inferiore nigra, antice directa, gracili et sat longa, apice acuta et leviter curvata, armata; tarso longo, cylindrato apice haud attenuato, tibia haud latiore; bulbo parvo simplici, dimidium basale tarsi tantum occupante. — Ins. Taprobane!

A *Viciria signata* E. Sim., cui affinis est, imprimis differt tibiis anticis haud fimbriatis et aculeis apicalibus metatarsorum multo minoribus.

V. sponsa sp. nov. — ♂. Long. 6 mill. — Cephalothorax fusco-rufescens, parte cephalica fere nigra, antice et utrinque læte coccineo-pilosa et macula media albo-nitido-squamulata, paulo longiore quam latiore et antice truncata, ornata, parte thoracica vitta submarginali alba lata, postice interrupta cincta. Pili oculorum læte rubro-coccinei. Clypeus crebre albo-pilosus. Abdomen

angustum, postice acuminatum, fusco-testaceum, fulvo-pubescens, supra vitta media alba integra postice sensim attenuata et postice utrinque linea tenui abbreviata nigra notatum, subtus, præsertim antice, fere nigrum sed utrinque vitta alba marginatum. Chelæ nitidæ, viridi-æneæ, antice deplanatæ, parum dense sed profunde transversim striatæ. Sternum læve et glabrum, nigrum, apice minute fulvum. Partes oris nigricantes. Pedes 1[i] paris obscure fusci fere nigri sed femore supra metatarsoque subtus dilutioribus et fulvo-rufulo-vittatis, tibia subtus parum dense et sat breviter nigro-fimbriata sed pilis tenuibus albis longis paucis ornata, metatarso aculeis inferioribus 2-2 longis (præsertim basalibus) armato sed aculeis lateralibus carente. Pedes 2[i] et 3[i] parium plus minus infuscati. Pedes 4[i] paris lutei. Pedes-maxillares fulvi, robusti; tibia patella breviore, haud angustiore, extus ad apicem apophysi nigra brevi, compressa, apice haud attenuata et truncata armata; tarso angusto, bulbo, simplici et disciformi, multo superante. — Ins. Taprobane : Colombo! Kandy! Galle!

A *Viciria diademata* E. Sim., cui affinis est, imprimis differt metatarsis anticis fuscis vel nigris et apophysi tibiali apice simpliciter secta haud bifida.

V. mustela sp. nov. — ♂. Long. 7 mill. — Cephalothorax obscure fulvus, versus marginem infuscatus, maculis ocularibus nigris et pone oculos maculis fuscis binis notatus, parte cephalica micanti-squamulata et macula media magna et ovata niveo-squamulata ornata, parte thoracica vitta lata semi-circulari albido-lutea ornata. Pili oculorum pauci cinereo-albidi. Clypeus setis albis longis paucis tantum munitus. Abdomen longum, atrum, vitta media integra albo-nitido-squamulata supra ornatum, subtus vitta lata, rarius linea exili, nigricanti notatum. Partes oris sternumque nigricantia, rarius obscure fulva, laminæ extus leviter prominulæ et ante angulum minute dentatæ. Chelæ nigro-æneæ, subtiliter transversim striatæ. Pedes quatuor antici robusti, fusco-castanei vel nigricantes, metatarsis tarsisque luteis, patellis tibiisque subtus et tibiis supra ad apicem longe et crebre nigro-fimbriatis, metatarsis brevibus aculeis validis 2-2 subtus armatis sed aculeis lateralibus carentibus. Pedes postici lutei, fusco-annulati, femoribus cunctis, præsertim subtus, longissime et parce albo-hirsutis. Pedes-maxillares fulvi fuscive; femore sat longo; tibia patella saltem haud breviore, apophysi apicali, antice directa, longa, gracili sed compressa, apice leviter ampliata, truncata et laciniosa, extus instructa; tarso sat angusto; bulbo leviter reniformi et obliquo, ad basin convexo. — Africa austro-orient : Natal (D[r] C. Martin).

V. lupula sp. nov. — ♂. Long. 6,5 mill. — Cephalothorax fusco-rufescens, versus marginem sensim obscurior, maculis ocula-

ribus nigris notatus, parte cephalica squamulis in medio albo-argenteis utrinque luteis vestita. Pili oculorum supra oculos coccinei, subtus breves albi. Clypeus fere nudus. Abdomen angustum, supra obscure fulvum, pallide micanti-squamulatum et utrinque linea nigra marginatum, subtus atrum, anguste albo-limbatum. Chelæ nigro-æneæ, transversim subtiliter striatæ. Partes oris fuscæ, testaceo-marginatæ. Sternum luteum. Pedes quatuor antici fusco-castanei, coxis metatarsis tarsis femoreque 2i paris ad basin luteis, haud fimbriati, metatarsis aculeis inferioribus brevibus 2-2 munitis sed aculeis lateralibus carentibus. Pedes postici lutei, femoribus ad apicem fusco-annulatis, patellis tibiisque leviter infuscatis. Pedes-maxillares obscure fulvi; tibia patella breviore et angustiore, intus setis longis penicillata, extus apophysi apicali nigra, obliqua, sat gracili apice leviter curvata armata; tarso lato, leviter rhomboidali; bulbo disciformi, subrotundo sed intus tuberculo obtuso munito, stylo circumdato. — Africa occid. : Gabon.

V. niveimana sp. nov. — ♂. Long. 7 mill. — Cephalothorax nigro-nitidus vel castaneus, parte cephalica squamulis albo-argenteo-micantibus ornata et utrinque, inter oculos, parce rubro-pilosa, parte thoracica vitta lata semicirculari fulva crebre luteo-pilosa cincta. Pili oculorum albi pauci et breves. Clypeus fere nudus. Abdomen angustum, atrum, supra crebre subtus parce argenteo-micanti-squamulatum. Chelæ, partes oris sternumque nigra. Pedes antici crassi, fusco-castanei, femore supra nigro subtus albido-crinito, patella tibiaque supra breviter subtus longissime et creberrime nigro-crinitis, metatarso tarsoque pallide luteis omnino crebre et longe niveo-hirsutis. Pedes quatuor postici fulvi, femoribus 3i paris apice leviter infuscatis. Pedes-maxillares fusci, intus nigro extus albo-criniti, supra breviter et parcius coccineo-pilosi; tibia brevi, apophysi apicali oblique divaricata et acuta extus armata; tarso longe attenuato; bulbo ovato et obliquo, ad basin leviter elevato et conico, intus stylo libero marginato. — Africa occid. : Sierra-Leone, Gabon.

V. semicoccinea sp. nov. — Long. 6 mill. — Cephalothorax niger, crebre coccineo-pubescens, macula cephalica magna luteo-pilosa sed antice supra oculos medios nivea et utrinque vitta submarginali latissima, postice convergente, luteo-pilosa decoratus. Pili oculorum læte coccinei. Clypeus fere nudus, parce albo-setosus. Abdomen angustum postice acuminatum, albo-pubescens, vitta media lutea vittis duabus coccineis marginata supra ornatum, subtus nigrum, parcissime pilosum et albo-marginatum. Sternum, partes oris chelæque nigro-nitida. Pedes quatuor antici nigro-castanei, metatarsis tarsisque luteis sed tarso 1i paris apice nigro,

femoribus patellis tibiisque subtus crasse et longe nigro-fimbriatis supra parce rubro-pilosis, tarso 1i paris longe setoso, metatarso brevi, aculeis inferioribus 2 2 longis aculeoque laterali interiore subbasilari munito. Pedes quatuor postici lutei, femore tibiaque 3i paris apice late nigris et nigro-pilosis. Pedes-maxillares nigro-castanei; tibia brevi, subtus et intus longe nigro-crinita, extus apophysi longa, oblique divaricata, recta, obtusa et intus minutissime serrulata munita; tarso sat lato, leviter rhomboidali; bulbo disciformi, in medio leviter depresso, stylo omnino circumdato. — Java : Mons Gede (Fruhstorfer).

Erasinus flavibarbis sp. nov. — ♂. Long. 4 mill. — Cephalothorax lævis, fusco-piceus, parte cephalica latissime nigro-marginata et rufulo-pubescenti, antice macula frontali magna luteo-squamulata postice macula minore albo-squamulata ornata, parte thoracica utrinque vitta latissima arcuata albo-pilosa notata. Pili oculorum inter oculos albi, subtus flavi. Clypeus creberrime flavo-barbatus. Abdomen angustum, supra fuscum, vitta media latissima, antice albo dein luteo-squamulata ornatum, subtus atrum fere glabrum, sed utrinque albido-marginatum et squamulatum. Chelæ breves nigro-nitidæ, apice rufulæ, antice ad basin area flavo-squamulata ornatæ. Partes oris sternumque fulvo-olivacea. Pedes lutei, femoribus ad apicem patellis tibiisque infuscatis albido-squamulatis, aculeis tenuibus longis et numerosis armati. Pedes-maxillares fulvi, fusco-variegati; tibia patella paulo breviore, longissime sed parce nigro alboque crinita, extus convexa et apophysi nigra submedia divaricata, recta sed apice minute uncata, armata; tarso magno, lato, sed longe attenuato, extus dilatato et apophysi setiformi marginali et infra directa munito; bulbo convexo, stylo libero longissimo munito. — Java : Mons Gede.

Chasidamna (1) **rufociliata.** — ♂. Long. 7-8 mill. — Cephalothorax fusco-rufescens, prope oculos niger, crebre rubro micanti-squamulatus, parte cephalica macula anteriore magna triquetra, postice, inter oculos, macula minore subrotunda, thoracica linea media abbreviata vittaque marginali latissima, postice interrupta, albo-luteo-squamulatis decoratus. Pili oculorum læte rubro-coccinei. Clypeus pilis albidis longis paucis munitus. Abdomen longum et angustum supra fusco-rufescens, roseo-micanti-squamulatum, lineis trinis, media abbreviata, albis, ornatum, subtus

(1) **Chasidamna** nov. gen. A *Viciria* differt pedibus quatuor posticis inter se subæqualibus, tibia 3i paris teretiuscula (apice haud incrassata), metatarsis quatuor posticis aculeis triverticillatis instructis; a *Chira* differt metatarsis anticis aculeis inferioribus 2-2, basalibus in medio vel pone medium articuli sitis, sed aculeis lateralibus carentibus, laminis maris extus obtusis. — Typus : *C. rufociliata* E. Sim.

fusco-testaceum, antice sensim dilutius et parce micanti-squamulatum. Chelæ nigro-nitidæ, striolatæ, validæ, extus convexæ, antice leviter inæquales, intus ad apicem, prope radicem unguis, tuberculo parvo et subrotundo, munitæ, marginibus sulci longis, dentibus remotis parvis et obtusis. Partes oris fusco-castaneæ, testaceo-marginatæ. Sternum fulvum, parce albo-pilosum. Pedes 1[i] paris reliquis robustiores, fusco-castanei, patella dilutiore, coxa metatarso tarsoque omnino fulvis, tibia supra rubro-pubescenti et macula magna albido-squamulata ornata, subtus crebre et sat longe nigro pilosa, femore subtus, ad marginem exteriorem sæpe nigro-fimbriato, metatarso gracili et longo, subtus, paulo pone medium, aculeis binis aculeisque apicalibus binis minoribus, tantum munito. Reliqui pedes fulvi, metatarso 2[i] paris aculeis inferioribus 2-2 et utrinque aculeis lateralibus binis parvis munito. Pedes-maxillares lutei; femore ad apicem leviter claviformi; tibia extus ad apicem apophysi parva gracili et incurva munita; tarso sat lato sed apice valde attenuato, supra in medio convexo; bulbo disciformi, stylo longissimo, circulos tres formante, circumdato. — Brasilia : Regio Amazonica tota; Matto-Grosso.

C. semifimbriata. — ♂. Long. 7 mill. — Cephalothorax pallide fusco-rufescens, prope oculos niger, parte cephalica (fere depile) squamulis albidis munita sed ad marginem frontalem rubro-pilosa, parte thoracica vitta submarginali latissima, postice late interrupta, albido-pilosa cincta. Pili oculorum læte rubro-coccinei, sub oculis mediis albi. Clypeus pilis crassis albis, clavatis et pediculatis conspersus. Chelæ validæ, nigræ, apice dilutiores et rufescentes, valde transversim striatæ et rugosæ, ad basin pilis albis longis munitæ, extus grosse striatæ, intus ad apicem, prope radicem unguis, tuberculo crasso, obtusissimo, sed intus anguloso, munitæ, marginibus sulci longis, dentibus parvis obtusis et remotis, munitis. Partes oris castaneæ, intus testaceo-marginatæ. Sternum coxæque lutea. Pedes 1[i] paris reliquis robustiores fusco-castanei, metatarso ad basin tarsoque pallide flavidis, tibia rubro-pilosa et supra macula albido-squamulata ornata, femore subtus, ad marginem exteriorem, tibia subtus, metatarso ad apicem (in parte fusca) et supra et subtus, longe et crebre nigro-fimbriatis, metatarso in parte apicali aculeis inferioribus longis 2-2 aculeoque minore laterali munito. Reliqui pedes lutei, tibia 2[i] paris apice infuscata, metatarso aculeis inferioribus 2-2 et utrinque aculeis lateralibus parvis binis instructo. Pedes-maxillares lutei, fere præcedenti. — Regio Amazonica : Sao Paulo de Olivença (de Mathan).

Chira (1) **trivittata** Taczanowsky, *Hor. Soc. ent. Ross.* 1872 *(Attus)*. — ♂. Long. 7 mill. — Cephalothorax niger, parte cephalica

(1) *Chira* = *Shira* G. et E. Peckham.

in medio dilutiore, obscure fulvo-æneo-pubescente, ad marginem anticum et prope oculos posticos pilis læte rufis paucis munita, utrinque crasse albo-pilosa et postice, inter oculos ser. 3ᵃᵉ, macula nivea triquetra ornata, parte thoracica antice dilutiore, vitta submarginali latissima, postice interrupta, fere omnino obtecta. Pili oculorum utrinque aurantiaci in medio albi. Clypeus subglaber, dimidio oculorum mediorum haud angustior. Abdomen angustum, supra obscure fulvum niveo-pubescens, vittis binis nigris integris notatum, subtus nigrum. Mamillæ nigræ. Sternum fulvum, parce albo-pilosum. Partes oris nigræ, laminæ extus valde tuberculatæ. Chelæ nigro-nitidæ, fere læves, robustæ, extus convexæ. Pedes flavi, patellis tibiisque quatuor anticis nigris, subtus nigro-ciliatis, tibiis supra macula niveo-pilosa ornatis, metatarsis apice infuscatis, tibiis metatarsisque posticis apice tenuiter nigro-cinctis. Pedes-maxillares nigri, apice tarsi albo; femore compresso et curvato, extus parce albo-piloso; patella parallela paulo longiore quam latiore; tibia breviore et angustiore, apophysi apicali parva, simplici et obtusa munita; tarso mediocri, ovato; bulbo valde convexo et conico, intus stylo crassissimo marginato. -- America merid. : Guiana et Brasilia.

C. luctuosa sp. nov. — ♂. Long. 6 mill. — Cephalothorax niger, obscure fulvo-olivaceo-pubescens, parte cephalica utrinque, inter oculos, albo-notata, thoracica linea media exili abbreviata, vittaque marginali albo-pilosis decorata. Pili oculorum et clypei densi et longi, albido-lutei. Abdomen supra nigrum, fulvo-pubescens, linea media exili lineaque marginali albis decoratum, subtus atro-testaceum, antice albo-pilosum. Chelæ fusco-rufulæ, nitidæ, transversim striatæ, marginibus sulci brevibus, dentibus ad radicem unguis parum remotis. Pedes fusci, femoribus apice fere nigris, tibiis metatarsisque macula media albo-pilosa supra decoratis, metatarsis anticis tibiis brevioribus, aculeis inferioribus 3-2 et utrinque aculeo parvo apicali armatis, metatarso 2ⁱ paris saltem intus aculeis lateralibus binis munito. Partes oris olivaceæ, laminæ extus prope medium in declivitate, minute dentatæ. Sternum fuscum, crebre et longe albo-crinitum. Pedes-maxillares lutei; femore apice incrassato et supra convexo claviformi; patella paulo longiore quam latiore apice attenuata et obtusa; tibia paulo breviore, ad basin angustiore, supra apice obtuse emarginata et extus apophysi crassa antice oblique directa armata; tarso angusto, longo et attenuato, extus ad basin minute dentato; bulbo magno, ad basin valde convexo obliquo et extus prominulo, ad apicem depresso et ovato, stylo recto, apicem tarsi attingente, munito. — Peruvia : Pebas (de Mathan).

C. lucina sp. nov. — ♂. Long. 6 mill. — Cephalothorax fulvo-rufescens, parte cephalica (fere depile) paulo obscuriore, maculis ocularibus nigris notata, thoracica in medio atque ad marginem nigro-pilosa sed vitta submarginali latissima semicirculari albo-pilosa ornata. Pili oculorum aurantiaci. Pili clypei, longi et densi, albi. Abdomen pallide luteo-testaceum, albo-pilosum, maculis parvis biseriatis et postice lineolis transversis abbreviatis 2 vel 3 nigricantibus supra ornatum, subtus concolor et parcissime pilosum. Chelæ longæ, fere parallelæ, antice deplanatæ, transversim striolatæ et intus carinatæ, nigro-æneæ sed apicem versus sensim dilutiores. Partes oris fusco-rufulæ, laminæ extus ad angulum dente uncata armatæ. Sternum pedesque quatuor postici lutea. Pedes antici fusco-rufescentes, supra maculis latis albo-pilosis ornati, metatarsis longis, aculeis inferioribus longis 2-2, metatarso 1^i paris aculeo laterali apicali minutissimo, metatarso 2^i paris aculeis lateralibus binis utrinque munitis. Pedes-maxillares fulvi parce albo-pilosi; femore sat robusto, curvato, subtus mutico sed leviter carinato; tibia patella multo breviore, apophysi apicali nigra, minutissima et obtusa extus armata; tarso sat longo et angusto; bulbo ovato, ad basin valde elevato et subacute turbinato, intus stylo libero et curvato marginato. — Brasilia : Tijuca prope Rio (E. Gounelle).

C. thysbe sp. nov. — ♂. Long. 7 mill. — Cephalothorax rubro-castaneus, maculis ocularibus nigris notatus, parte cephalica pilis coccineis, ad marginem frontalem, supra oculos, longioribus, vestita et vitta media alba notata, parte thoracica vitta submarginali lata, postice interrupta, albo-pilosa cincta. Pili oculorum læte coccinei sed sub oculis mediis albi. Clypeus longe sed parce albo-barbatus. Abdomen vitta media integra fulvo-olivaceo-pilosa et late albo-marginata supra notatum, subtus fusco-testaceum, parce pilosum et luteo-marginatum. Chelæ latæ, extus convexæ, nigræ, apice rufescentes, marginibus sulci longis et depressis, ungue longo et valido. Partes oris castaneæ. Sternum pedesque lutea, patellis tibiisque quatuor anticis fusco-castaneis, tibiis supra macula lata nivea ornatis, subtus sat longe nigro-fimbriatis, metatarsis longis, aculeis inferioribus 2-2 armatis sed aculeis lateralibus carentibus. Pedes-maxillares lutei, sat longi et graciles; femore curvato subtus carinato sed mutico; tibia patella vix breviore, apophysi nigra minutissima extus ad apicem armata; tarso mediocri, sat angusto; bulbo simplici, disciformi, leviter cordiformi, intus stylo libero subrecto munito. — Brasilia : Rio (Germain).

C. aculeata sp. nov. — ♂. Long. 6 mill. — Cephalothorax fusco-rufescens, parte cephalica nigra, coccineo-pilosa, vitta media lata nivea ornata, parte thoracica nigro-marginata, antice, pone

oculos, maculis binis, dein vitta submarginali lata, albo-pilosis, ornata. Pili oculorum aurantiaci. Pili clypei, in medio densi et longi, albi. Abdomen supra fulvum, vitta latissima aurantiaco-pilosa et albo-marginata ornatum, subtus nigrum parce et minute albo-pilosum. Chelæ et partes oris nigræ. Sternum fulvum, antice sensim infuscatum. Pedes quatuor antici obscure fusci, coxis, patellis metatarsis tarsisque luteis, patellis tibiisque subtus crebre niveo-ciliatis, metatarsis aculeis inferioribus longis et utrinque aculeo parvo apicali munitis. Pedes postici lutei, valde aculeati, metatarsis aculeis triverticillatis munitis. Pedes-maxillares fusco-castanei, robusti; femore crasso, subtus in medio ampliato et obtuse tuberculato; tibia brevi, annuliformi, apophysi exteriore cariniformi arcuata fere semicirculari sed apice recurva et acuta armata; tarso lato; bulbo maximo, valde convexo, inæqualiter bilobato. — Lombok (Fruhstorfer).

Alcimonotus (1) **Gounellei** sp. nov. — ♂. Long. 7 mill. — Cephalothorax fusco-castaneus, prope oculos niger, parte cephalica subtiliter coriacea, rubro-pilosa, macula media magna et ovata alba ornata, thoracica nigro-pilosa sed vitta submarginali albo-pilosa latissima, postice interrupta, antice utrinque (inter oculos ser. 2ᵃᵉ et ser. 3ᵃᵉ) ramulum obliquum emittente, ornata. Pili oculorum læte rubri. Pili clypei densi nivei. Abdomen breviter ovatum, supra fuscum, fulvo-rufulo-pubescens, in parte basali late et oblique albo-marginatum, subtus dilutius et parce luteo-pubescens. Chelæ angustæ et longæ, fere parallelæ, extus convexæ et setis cinereis longissimis divaricatis et curvatis munitæ, antice in parte apicali inæquales et transversim striatæ, nigræ, apice rufescentes, intus pilis albis munitæ, marginibus sulci sat brevibus et subtransversis, ungue longo et gracili. Partes oris fuscæ, apice dilutiores, laminæ extus valde turbinatæ. Sternum coxæque lutea. Pedes antici fusco-castanei, apice dilutiores, metatarsis ad basin tarsisque luteis, supra maculis albo-pilosis ornati, subtus setis tenuibus et longis parce muniti, metatarsis tibiis vix brevioribus, subtus aculeis validis 2-2 et utrinque aculeo parvo apicali munitis. Reliqui pedes obscure fulvi. Pedes maxillares lutei, apice leviter infuscati; femore patellaque albo-pilosis; femore curvato apice leviter incrassato; patella parallela longiore quam latiore; tibia patella multo breviore et angustiore apophysi apicali minutissima armata; tarso longe ovato; bulbo reniformi ad basin conico, stylo libero longo intus munito. — Brasilia : Matushinos, prov. Minas (E. Gounelle); Paraguay (Germain).

(1) **Alcimonotus** nov. gen. A *Chira* imprimis differt area oculorum dorsalium postice quam antice haud angustiore. — Typus : *A. Gounellei* E. Simon.